

鼠疫治驗談 (李健) 鼠疫發生於熱帶之區。為最惡之傳染病。其傳染之速。實為可懼。...

本報徐元誥律師為常年法律顧問 特聘羅家衡大律師為常年法律顧問

風流小病 (秋) 世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。...

駝背 (顧健) 症狀 駝背。即俗稱之「背脊彎」。...

朱振賢醫師 楊志一醫師 例 (甲)特號二元 (乙)門診一元...

幸福報 第220期 (日三十月五年九十國民) 廣告價目...

好消息 本報最新出版之家庭醫藥...

經驗良方

陰虛受傷方 (楊野鶴)

男子當初婚之時。不免性慾過度。以致陰虛受傷。出血疼痛。先以熱湯洗淨。隨用珍珠散加冰片搽之。腐皮漸乾。痛自漸止。余嘗遇診之時。見此症者。每用此方。輒效。

陰虛腫痛方 (前人)

威靈仙二兩。煎汁。泡洗即愈。若小兒陰虛腫痛。人驚作驚。致氣閉腫大者。宜急抱坐冷水中。即刻縮小而愈。

金瘡止血方 (楊野鶴)

蝦花 (即蠶蛾身上毛。取法用

黃梅時節家家雨

素丙乙

黃梅時節。陰氣鬱。陰雨霏霏。連月不開。人當此際。坐立俱感不快。體弱者且頭痛身重。舉止無力。精神困憊。胃納失調。病狀乘間發動。滿佈自然界中。其流行之迅速。陰濕之毒。以視今日最流行之反動派。共產黨。亦無多讓焉。吾人起居飲食方面。一有不慎。輒易造成病機。於利於害。故茲有之云。批把黃。郎中忙。信而有徵。正非無稽之論也。不觀夫門戶隔壁。家常什物乎。當此期內。非日用之品。鮮有不微積重者。蓋太陰濕土司令。其中人。有如此者。是宜飲清茹淡。節飲茶。調其作息。適其寒溫。則黃梅時節。衛生之道。其庶幾乎。

治脫臭驗方

(佚名)

方用大細絲一。以黃泥包裹。入赤石脂鹽各少許。包好煨研。加粉一分。隨睡時隨時敷腋下。次日登

最新出版 青年病

之切青年一
之切青年一
之切青年一

一、夢遺滑精。二、早洩。三、陽痿。四、遺精。五、淋病。六、梅毒。七、白濁。八、下疳。九、橫痃。十、魚口。十一、便毒。十二、瘡毒。十三、痔瘡。十四、脫肛。十五、疝氣。十六、水腫。十七、癰疽。十八、疔瘡。十九、無名腫毒。二十、一切瘡毒。

軍醫生活記



(十二) 回頭再向那炮兵營的住所一看。房子倒也很好。可是住了兵。便好像隔了。我便問連長道。這房子不是營房嗎。是甚麼人家的房產呀。連長道。這房子。是以前在時過境。一個鼎鼎有名的營長。便做了我們營軍人的吃飯地了。我聽了這話。不覺也與了余油。余油之威了。向東走了大半里路。便到了一個很大的衙門。房屋極其高大。而且還有十幾道天井。由前門走到最後一層。倒有十里之遙。席樂三指着我道。這房子便是安徽督軍署。本地人又叫做老將軍府。是以以前安徽督軍張文生造的。因為形勢險要。扼津浦路的南段。所以將督署。由安徽省城。遷到這裏。我方才了然。說着。已到最後一層。他便將我帶上樓。却巧居督長在家。當下連長先向居督長敬禮。又介紹我見了。居督長也現出和悅的顏色。同我談了好久。隨向連長道。明天帶他一同去見師長吧。請師長轉呈總司令。委任他當軍醫吧。連長連聲說。好。我個覺得奇怪。原來一個小小的軍醫。也要師長轉呈總司令委任。不像從前任用下級官。師長團長可以直接委任的。當下又談了一刻。居督長約定第二天搬進營內去住。於是辭別而出。連長便同我又到客棧。我又介紹幾個學生見了。當晚我們便在旅館中。住了一夜。(未完)

營出中焦衛出下焦之研究

平源李健

中西匯通精義曰。一。胸上膈膜為上焦。中生板油為中焦。下之制油膜為下焦。其根出於腎系。一。蓋上焦由兩腎中間油膜所生之板油。即三焦之焦原。其於脊骨。連膈之膜。入心包絡。連肺系。其外出為手背胸膈之膜。中焦從板油連及雞冠油。著於小腸。其外出為腰腹之膜。下焦從板油連及雞冠油。後連大腸。前連膀胱。中為胞室。其外出為腎系小腹之膜。三焦於周身之臟腑經絡。均有連帶。膈胃中水液。由此輸送於膀胱。決瀉通快。則周身通泰。內經曰。營出於中焦。衛出於下焦。至哉言乎。夫營氣由穀入於胃。受中焦之潤和。及消化之作用。乃化為液。從小腸而上奉於

格節食以去病。寡慾以延年。言氣氣成了病。笑笑活了命。

本館出版 家庭醫藥寶庫

是家庭常年之醫藥顧問
巨著 怪病奇治全集
是全國名醫之空前傑作

治癩痢龍虎丸方

賈樂興錄

面黃三分巴豆三分水。煎一分白。三分粉。加米粉為丸。此方部小村。中承。新仲方。應助所傳。專治癩痢。不省人事。登高乘衣。笑歌不寐等。或神呆靜坐。語言不發。皆痰迷心竅之患。此者輕則用藥三三。重則四五。連年者須多服數丸。以半溫開水送服。徐圖效驗。若不省吃者。納丸於粉餅內食之。約半時許。非吐即瀉。間有不吐瀉而愈者。愈後宜忌食豬肉。二年。以免復發。孕婦忌服。體虛忌服。金幼香曰。癩痢之疾。皆由痰迷心竅之症。痰入心包絡。自信等能燥。以之為君。巴豆辛熱。燥。下。使白信之性。過而不留。以之為臣。及反以牛黃之甘寒。通靈辟邪。清心解毒。則白信巴豆之猛。合而為平。故能奏效如神。其藥也。或將白信減輕一分。便失製方本意。須照原方分兩配合。每料一百二十粒。每六粒為一丸。服用此方者。勿以此藥猛烈為嫌。勿以吐瀉為忌。應沉河可也。壽域同登。此病愈後。按服侯氏黑神散方。使包絡不復生。尤安。

傷科方劑一束

(吳宏鼎)

跌打損傷。用大酒。一尾。獨核。一尾。胡。七粒。黃。一尾。老。一尾。三。野。一尾。乾。一尾。香。一尾。紹。一尾。